



Herbicide
OSCAR 75 WP

مبيد عشبي
أوسكار WP 75

Famille : Sulfonylurées
Matière active : Tribénuron - Méthyle
Concentration : 75%

العائلة : سلفونيل يوريا
المادة الفعالة : تريبنرون ميثيل
التركيز : 75%

Propriétés

- **OSCAR 75** qui contient la matière active Tribénuron - Méthyle s'applique en post levée des céréales de printemps et d'hiver. Il est absorbé par les feuilles et les racines de mauvaises herbes et véhiculé dans la plante.
- **OSCAR 75** qui est doté d'une importante systémie, agit sur la mauvaie herbe en inhibant l'enzyme acétolactate synthétase conduisant à la synthèse des acides aminés ramifiés.
- **OSCAR 75** est efficace sur de nombreuses dicotylédones annuelles ou vivaces après deux semaines, (matricaires, bleuet, coquelicot, stellaire, renouée des oiseaux, renouée liseron, rumex, chardon, crucifères, ombellifères).
- **OSCAR 75** donne de bons résultats s'il est appliqué sur des adventices ne dépassant pas le stade 4-5 feuilles.
- **OSCAR 75** n'est pas néfaste pour les cultures avoisinantes.

Utilisation

Cultures	Adventices	Doses
Céréales (blé, orge)	Adventices annuelles	12 g/ha

Stade d'application

A partir du stade (2-3) feuilles des céréales jusqu'au stade 2 nœuds.
Meilleure efficacité, en application sur les mauvaises herbes au stade jeune (3 feuilles).

Compatibilité

OSCAR 75 est compatible avec la plupart des anti-graminées utilisées.

الخواص

- **أوسكار** مبيد عشبي يحتوي على المادة الفعالة تريبنرون ميثيل يستعمل بعد إنبات الحبوب الشتوية والضيوية، يمتص بسرعة وبشكل فعال عن طريق المجموع الخضري و عن طريق جذور الأعشاب الضارة و ينتقل بسهولة في النبتة.
- **أوسكار** مبيد عشبي جهازي فعال على الأعشاب الضارة و ذلك بإيقافه للأنزيم أسيتولاكتات سانتاز الذي يؤدي إلى تركيب الأحماض الأمينية.
- **أوسكار** جد فعال على العديد من الأعشاب الضارة الحولية الثنائية الفلقة بعد أسبوعين من بينها الأفحوان، الدبيق الخردل البري، الفريضة، الهند باء البرية، عشبة الغليون و غيرها من الأعشاب عريضة الأوراق على القمح والشعير.
- **أوسكار** يعطي نتائج ممتازة إذا ما استعمل عندما تكون الأعشاب الضارة الفتية (4-5أوراق).
- **أوسكار** لا يؤثر على المحاصيل المجاورة.

الاستعمال

المعدل الاستعمال	الأعشاب الضارة	المحصول
12.5 غ/هكتار	الأعشاب الحولية	القمح والشعير

فترة الاستعمال

من مرحلة 2 إلى 3 أوراق من نمو الحبوب إلى غاية عقدتين.
لفعالية أحسن استعمل أوسكار في المراحل الأولى من نمو الأعشاب الضارة (3 أوراق).

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات العشبية (أحادية الفلقة).