



Insecticide DIAZINON 60 EC

Famille : Organo phosphorés
Matière active : Diazinon
Concentration : 60%

Propriétés

- **DIAZINON 60** qui contient la matière active Diazinon agit par contact, ingestion et légèrement en vapeur.
- **DIAZINON 60** qui se présente sous forme de concentré émulsifiable a un mode d'action sur les synapses et les neuromédiateurs en inhibant l'acétylcholinestérase.
- **DIAZINON 60** est doué d'un large spectre d'action contre les insectes suceurs, broyeurs (stades larvaires), cochenilles, aphides, psylles du poirier et acariens.
- **DIAZINON 60** a une persistance d'action sur le feuillage de l'ordre de 8 jours.

Utilisation

Cultures	Parasites	Doses	Délai avant récolte
Arbres fruitiers	Puceron, Carpocapse	75-125 ml/hl	14 jours
Olivier	Mouche d'olivier		7 jours
Cultures maraîchères	Puceron, Cicadelle	125 ml/hl	
Sol en pépinière	Insectes		

Autres recommandations

- Vigne : Vers de grappes 50 ml/hl.
- Fraisier : Mouche 50 ml/hl.
- Arbres fruitiers et Vigne : Insectes 100 ml/hl.
- Cecidomyies du poirier après chute des pétales : 0.5 L/ha.

Observations

- Toxique pour les abeilles
- Déconseiller de traiter lors de la floraison.

Compatibilité

DIAZINON 60 est compatible avec la plupart des pesticides sauf les alcalins

مبيد حشري

ديازينون 60 EC

العائلة : فوسفوري عضوي
المادة الفعالة : ديازينون
التركيز : 60%

الخواص

- **ديازينون 60** مبيد حشري يحتوي على المادة الفعالة ديازينون يعمل باللامسة و عن طريق الجهاز الهضمي.
- **ديازينون 60** مبيد حشري على شكل مركز مستحلب فعال على المشابك العصبية و على الوسائط الكيميائية العصبية وذلك بإيقافه لفرز الأسيتيل كولين أستراز.
- **ديازينون 60** فعال على عدد كبير من الحشرات الماصة، الأكلة (في طور اليرقات)، الحشرات القشرية، المن، بسبب الأخاص و العناكب.
- **ديازينون 60** له فعالية فوق الأوراق تدوم لمدة 8 أيام.

الاستعمال

فترة الأمان	معدل الاستعمال	الحشرات	المحصول
14 يوم	125-75 مل/هـل	المن، كاريوكابس دودة القمار	الأشجار المثمرة
7 أيام		ذبابة الزيتون المن، نطاطات الأوراق	الزيتون الخضروات
	125 مل/هكتار	الحشرات	التربة في المشاتل

استعمالات أخرى

- العنب : دودة العنقود 50 مل/هـل.
- الكرز : الذبابة 50 مل/هـل.
- الأشجار المثمرة و العنب : الحشرات القشرية 100 مل/هـل.
- Cecidomyies الإخاص بعد سقوط البتلات : 0.5 ل/هكتار.

ملاحظات

- سام للنحل.
- لا ترش أثناء مرحلة الإزهار.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا القلوية لأنها تنقص من فعالية المبيد.