



ACARICIDES



Insecticide et acaricide VAPCOMIC 1.8 EC

Famille : Avermectines
Matière active : Abamectin
Concentration : 1,8%

مبيد حشري وعناكبي فايكومك 1.8 EC

العائلة : أفرمكتين
المادة الفعالة : أبامكتين
التركيز : 1.8%

Propriétés

- **VAPCOMIC 1.8** contient l'Abamectin (insecticide, acaricide) obtenu par fermentation de Streptomyces avermitilis et qui a une action sur les synapses des arthropodes, d'où l'absence de résistance croisée avec les autres insecticides et acaricides.
- **VAPCOMIC 1.8** agit par ingestion et dans une moindre mesure par contact sur les formes mobiles d'acariens (acarien rouge et acarien bronzé) et sur les insectes piqueurs (thrips, psylles, mouches et mineuses...) et Boufaroua du palmier dattier.
- **VAPCOMIC 1.8** est translaminaire et possède une longue persistance d'action (3 à 6 semaines) et s'utilise sur un grand nombre de cultures comme le chou-fleur, chou, concombre et agrumes.

Utilisation

Cultures	Parasites	Doses	Délai avant récolte
Cultures légumières Plantes ornementales	Mineuse Acariens	50-70 ml/hl	10 jours
Fraisier	Acarien rouge		
Arbres fruitiers	Psylle	50 ml/hl	28 jours
Palmier dattier	Boufaroua		

Observations

- Le résultat du produit apparaît 3 à 5 jours après le traitement, bien que l'effet s'observe directement après l'application.
- Ne pas dépasser 110 ml/hl d'eau.
- Dangereux pour les abeilles.
- Ne pas pulvériser sur fleur de giroflée.

Compatibilité

Toxique pour les rosacées fruitières quand le produit est mélangé avec le produit **CRIPATAN**.

الخواص

- **فايكومك** مبيد حشري عناكبي يحتوي على الأباكتين الناتج عن تخمر ستربتوميس أفرمتلس. له فعالية على المشابك العصبية لمفصليات الأرجل الخاصة التي جعلته فعال حتى على الحشرات و العناكب التي اكتسبت مناعة مزدوجة ضد المبيدات الحشرية و مبيدات العناكب.
- **فايكومك** يعمل عن طريق الجهاز الهضمي وبأقل فعالية عن طريق الملامسة على الأشكال المتحركة (العنكبوتيات الحمراء والبرونزية) و على الحشرات الثاقبة مثل (التريس، البسيلا، صانعات الأنفاق...).
- **فايكومك** له خاصية النفاذية داخل الأنسجة النباتية، مدة فعاليته طويلة تمتد من 3 إلى 6 أسابيع ويستعمل لعدد كبير من المحاصيل مثل (الزهرة، الملفوف، الحمضيات).

الاستعمال

المحصول	الحشرات	معدل الاستعمال	فترة الأمان
الخضراوات نباتات الزينة	صانعات الأنفاق العناكب	70-50 مل/هل	10 أيام
الفراولة	العناكب الحمراء		
الأشجار المثمرة	البسيلا	50 مل/هل	28 يوم
التخيل	بوفاروا		10 أيام

ملاحظات

- تبدأ ظهور نتائج المكافحة بعد 3-5 أيام من الرش علما بأن تأثير المبيد يبدأ بعد رشه مباشرة.
- كمية محلوق الرش لا يجب أن تزيد عن 110 مل/هل من الماء.
- **فايكومك** سام للنحل.
- لا يرش على أزهار القرنفل
- سام للتفاحيات عند خلطه مع المبيد **كربتان**.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات و لكن ينصح بعمل تجربة خلط بسيطة قبل الرش.