



Fongicide systémique PROLEX

Famille : Dicarboximides
Matière active : Procymidone
Concentration : 50%

مبيد فطري جهاري برولكس

العائلة : ديكاربوكسميد
المادة الفعالة : بروسيميدون
التركيز : 50%

Propriétés

- **PROLEX** est un fongicide systémique qui agit préventivement par inhibition de la germination des spores et blocage du mycélium. Il agit aussi curativement, en stoppant la propagation du champignon.
- **PROLEX** agit principalement sur les pourritures grises dues à Botrytis cinerea. Son spectre d'action s'étend également aux sclérotinioses et aux monilioses.
- **PROLEX** est faiblement toxique pour les mammifères et non toxique pour les abeilles et les poissons.

Utilisation

Cultures	Maladies	Doses	Délai avant récolte
Tomate sous serre	Botrytis	150 g/hl	3-7 jours

Autre recommandations

- Arbres fruitiers : Moniliose sur fleurs et rameaux : 75 g/hl.
- Concombre sous serre : pourriture grise, sclérotiniose 750 g/ha.

Compatibilité

Compatible avec la plupart des pesticides sauf ceux alcalins.

الخواص

- **برولكس** مبيد فطري جهاري، يمنع انتشار الأبواغ ويوقف تطور الميسليوم، وبالتالي توقف انتشار الفطر.
- **برولكس** يؤثر أساساً على العفن الرمادي الناتج عن بوتريتييس، يمتد استعماله كذلك على العفن الأبيض (سكلروتينيوز) والمونيليا (العفن البني للأشجار المثمرة).
- **برولكس** ضعيف السمية على الثدييات وغير سام على النحل والأسماك.

الاستعمال

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	فترة الأمان
طماطم البيوت البلاستيكية	بوتريتييس (العفن الرمادي)	150 غ/هل	3 - 7 أيام

استعمالات أخرى

- الأشجار المثمرة : المونيليا على الأزهار والأغصان : 75 غ/هل.
- خيار البيوت البلاستيكية : العفن الرمادي، العفن الأبيض : 750 غ/هكتار.

قابلية الخلط

قابل للخلط مع معظم المبيدات ما عدا المبيدات القلوية.