



Répulsif REPELL

Famille : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
Matière active : Anthraquinone
Concentration : 80%

Propriétés

- **REPELL** est un produit répulsif à l'égard des corbeaux et autres oiseaux nuisibles.
- **REPELL** empêche les oiseaux de se nourrir des semences, des fruits des arbres fruitiers et des cultures maraichères.
- **REPELL** s'utilise par enrobage des semences tel que céréales, maïs, pois, haricot, etc.
- **REPELL** ne réduit ni la faculté germinative des semences ni le goût des produits traités.
- **REPELL** peut être associé lors de l'enrobage des semences avec d'autres pesticides.

Utilisation

Cultures	Ravageurs	Doses	Délai avant récolte
Traitement de semences	Oiseaux nuisibles	60-90 g/ql de grains	7 jours
Toute culture		1-2 kg/hl	

Traitement des semences

- Mélanger 60-90 gr de **REPELL** dans 200-400 ml d'eau, puis mélanger à 1 quintal de semences.

Traitement sur champ

- Mélanger 1 à 2 kg/hl d'eau.
- Pulvériser dès les premiers dégâts.
- Répéter le traitement en cas de nécessité ou après une pluie.

منفر الطيور ريبيل

العائلة : هيدروكربور أروماتيك بولي سكليك
المادة الفعالة : انثراكينون
التركيز : 80%

الخواص

- **ريبيل** مبيد منفر للطيور، الغراب والطيور الضارة أخرى.
- **ريبيل** يمنع الطيور من التغذية بالبذور وثمار الأشجار والخضراوات.
- **ريبيل** يستعمل كغلاف للبذور مثل الحبوب، الذرة، البازلاء والفاصولياء.
- **ريبيل** لا ينقص قدرة البذور على الانتاش ولا يؤثر على ذوق المحاصيل المعالجة.

الاستعمال

المحصول	الآفة	معدل الاستعمال	فترة الأمان
معالجة البذور	الطيور الضارة	60-90 غ/قنطار من البذور	7 أيام
كل المحاصيل		1 - 2 كغ/هـل	

معالجة البذور

- مزج 60 - 90 غ من **ريبيل** مع 200 - 400 مل ماء.
- رش المحلول على 100 كغ من البذور.

المعالجة في الحقل

- مزج 1 - 2 كغ/هـل ماء.
- رش مع ظهور الدلائل الأولى لضرر الطيور.
- كرر الرش عند الضرورة أو بعد سقوط المطار.