



NOFAR-2

Propriétés

Rodenticide anticoagulant, irradique tous types de rongeurs (rats, souris ...).

Facile d'utilisation dans tous les endroits infestés par ces rongeurs.

NOFAR-2 1 seule dose permet d'éliminer les rongeurs.

NOFAR-2 Elimine même les rongeurs qui ont développé une immunité vis à vis des autres rodenticide anticoagulants.

NOFAR-2 très toxique pour les rats et souris et moins toxique pour d'autres animaux.

NOFAR-2 Aucun rongeur ne résiste à cet appât. **NOFAR-2**, ainsi ingéré est rapidement mortel.

NOFAR-2 Economique, car la dose mortelle est étudiée d'où une efficacité à faible dose.

Utilisation

- lors de l'utilisation de rodenticide, il faut prendre en considération que les rats et les souris sont considérés comme des animaux très intelligents et pour cela, le choix de l'endroit idéal où mettre l'appât est primordial.
- mettre les cubes de **NOFAR-2** dans des endroits infestés, aux endroits de passage des rongeurs et autour de leurs gîtes.

Précautions d'emploi

- Lire attentivement la notice avant utilisation et se référer aux recommandations.
- Avant de commencer le traitement, protégez-vous bien avec des vêtements, chaussures, gants et lunettes adéquates.
- Eviter de manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Eviter de polluer les flaques d'eau, sources et canalisation d'eau potable.
- Se débarrasser de l'emballage dans le respect de l'environnement et la protection de la nature.
- Eviter d'utiliser 2 fois le rodenticide la même semaine.
- En cas de non ingestion des grains, repérer exactement les endroits où les grains sont déposés.
- Débarrassez-vous des grains restants après la durée du traitement, et avant de les incinérer, mettez les dans des sachets en plastique en prenant le soin de mettre des gants protecteurs.
- Mettre les rongeurs morts dans des sachets en plastique, les saupoudrer puis les incinérer ou les enterrer.
- Eloigner les enfants et les animaux domestiques des endroits traités.
- Mettre l'appât dans une caisse spéciale pour éviter d'éventuels accidents.

Élimination du produit et de l'emballage

- tenir **NOFAR-1** hors de la portée des enfants et loin des denrées alimentaires.
- ne pas réutiliser les emballages vides à d'autres fins.
- ne pas polluer les eaux courantes et plans d'eau.
- ne pas vider les restes de bouillie dans les eaux poissonneuses ou servant à abreuver les animaux

Stockage

- A stoker dans son emballage d'origine et hermétiquement fermé.
- Entreposer hors de la portée des enfants, des animaux et loin de toute source de nourriture et de boisson, préférablement dans un entrepôt verrouillé.
- Entreposer dans un endroit frais, sec, bien aéré et pas exposé au soleil.



Les premiers secours

- Procéder à un lavage gastrique rapide et dans les plus brefs délais si l'intoxication est récente.
- Faire des prélèvements sanguins pour connaître le :
 - Taux d'hémoglobine.
 - Temps de coagulation.
 - Groupage sanguin et éventuellement transfusion sanguine.
- Injecter 20 mg de VIT K1 lentement en intra-veineuse (I.V). Injecter la VIT K1 en intra-musculaire (I.M) s'il n'y a pas urgence.
- Consulter le temps de coagulation chaque 03 heures et procéder à une autre injection de VIT K1 s'il n'y a pas d'amélioration clinique du malade.
- Le temps de coagulation s'est stabilisé continuer de traiter / VIT K1.
- Garder le malade sous surveillance médicale pendant 03 jours si son état de santé s'améliore.

Antidote

Vitamine K 1